

Formulario de Consentimiento Informado para IMPLANTES DENTALES

---

D./Dña. EMILIANO SAL VILLEJA, DNI 13983918-X mayor de edad, con domicilio en TUÑELAUEGA, provincia de Cantabria, DECLARA:

Que he sido informada por el doctor abajo firmante de lo siguiente:

- 1º. Que es conveniente proceder a realizar un tratamiento con implantes dentales.
- 2º. Que el propósito principal de la intervención es la reposición de los dientes perdidos. Sé que alternativamente podría recurrir a prótesis convencionales pero lo descarto por los beneficios que se pueden obtener con la técnica implantológica.
- 3º. Que el tratamiento que voy a recibir implica la administración de anestesia local, que consiste en proporcionar, mediante una inyección, sustancias que provocan un bloqueo reversible de los nervios de tal manera que se inhibe transitoriamente la sensibilidad con el fin de realizar el tratamiento sin dolor.
- 4º. Que tendrá la sensación de acorcharamiento del labio o de la cara, que normalmente van a desaparecer en dos o tres horas.
- 5º. Que la administración de la anestesia puede provocar, en el punto en el que se administre la inyección, ulceración de la mucosa y dolor, y menos frecuentemente, limitaciones en el movimiento de apertura de la boca, que pueden requerir tratamiento ulterior; y que la anestesia puede provocar bajada de tensión que, en casos menos frecuentes, pueden provocar un sincopal o fibrilación ventricular, que deben tratarse posteriormente, e, incluso, excepcionalmente, la muerte.
- 6º. Que aunque de mis antecedentes personales no se deducen posibles alergias o alergia al agente anestésico, la anestesia puede provocar urticaria, dermatitis, asma, edema angioneurótico (asfixia), que en casos extremos puede requerir tratamiento urgente.
- 7º. Que el procedimiento se lleva a cabo en dos fases, una primera en la que se fijan tornillos al hueso, y una segunda (pasados un tiempo variable), cuando el tornillo esté integrado con el hueso, se coloca un pilar sobre ellos para recibir posteriormente la prótesis sobre el implante.
- 8º. Que aunque se me han practicado los medios diagnósticos precisos, es posible que puedan producirse procesos edematosos, inflamación, hematomas, dolor o laceraciones en la mucosa del labio o mejilla, o en la lengua, que no dependen de la técnica empleada ni de su correcta realización, e incluso la posibilidad de lesionar el seno maxilar y provocar una sinusitis que deba ser tratada posteriormente por el especialista competente.
- 9º. Que, con menos frecuencia e independientemente de la técnica empleada y de su correcta realización, es posible que se produzcan lesiones de tipo nervioso, por afectar a terminaciones nerviosas o nervios próximos, lo que generar pérdida de sensibilidad en los labios, el mentón, la lengua o la encía, según cual sea el nervio afectado. Generalmente la pérdida de sensibilidad es transitoria, aunque puede llegar a ser permanente.